



Tratamento do usuário de drogas e as difíceis decisões terapêuticas

Carla Bicca

Psiquiatra Terapeuta Cognitiva
Especialista em transtornos aditivos
Diretora adjunta Regional Sul / ABP

Diretora Villa Janus

carlabicca10@gmail.com



Resolução [1595 do CFM](#) e

Norma da RDC [102 da ANVISA](#)

Meus conflitos de interesse

Pesquisadora associada Developmental Cognitive Neuroscience Lab (DCNL) e
Centre of Studies and Research in Traumatic Stress (NEPTE)

Membro do Departamento de DQ/APRS

Consultório Privado

Sócia da Villa Janus

Diretora adjunta Regional Sul ABP

Trabalho voluntário ABP, APRS

Não tenho conflitos de interesse

Não recebo indústria farmacêutica, do álcool, tabaco ou maconha

Não tenho vínculo com qualquer indústria ou comércio

Uso de Substâncias



Quando inicia?

Onde costuma ocorrer?

Com quem ocorre?

Que drogas são as primeiras?

Crenças Aditivas

Prazer

Crenças familiares


Infância

Alívio

Desenvolvimento

Experiências de vida

Evolução



Evolução



Evolução




Qual o momento de PREVENIR?





Uso de substâncias





Carla Bicca
carlabicca10@gmail.com



Desenvolvimento da relação com substâncias



Experimentação



Uso regular



Uso com problemas



Adição

Desenvolvimento da relação com substâncias



Uso com problemas



Adição



47% se submeteriam a um tratamento

Desenvolvimento da relação com substâncias



Uso com problemas

Adição


47% se submeteriam a um tratamento

18,9% não desejam interromper ou diminuir o uso


18,8% gostariam de se tratar diminuir o consumo

34% aceitariam internação involuntária

Problemas com Substâncias



Problemas com Substâncias



Transtorno Aditivo

2 ou mais dos seguintes (12 meses)

Tolerância

Abstinência

Perda do Controle

Fissura

Tempo

↓ **do repertório de atividades sociais**

Continua o uso apesar dos problemas



De 4 a mais de 20 tentativas até parar de fumar

Quem mais consegue é quem mais tenta

Prochanska e DiClemente, 1993

